

«ГАМ-КОВИД-ВАК» - КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:

I компонент



(число, месяц, год)

II компонент



(число, месяц, год)

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течении трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение региональных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ:

Рекомендуется в течении 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При температуре тела выше 38 С принять жаропонижающие и обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен). Если температура тела выше 39 С и не снижается в течение 4-х часов после приема медикаментов, необходимо вызвать врача.